

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সমূহে পরিবেশসম্মত ভাবে ইন্দুর ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প Ecologically based Rodent Management Training at CHTs Project

ছেট গোঁজো ইন্দুর : (*Rattus exulans*)

ছেট গোঁজো ইন্দুর দেখতে অনেকটা বড় গোঁজো ইন্দুরের মতই। তবে কিছুটা নথাটে, সালতে বাদামী বর্ণের এবং আকারে গোঁজো ইন্দুরের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ছেট হয়ে থাকে (সাধারণত: ৫০-৭০ শায়ি)। এদের পেটের পশম সাদাটে এবং লেজের দৈর্ঘ্য মাথা ও শরীরের তুলনায় লম্বা হয়ে থাকে। সাধারণত: বজ্রে ৭/৮ বার এবং প্রতিবার ৩-৬ টি করে বাচ্চা প্রসব করে থাকে। এদেরকে সাধারণত: মাটে কম দেখা যায়, তবে বাড়ির আশেপাশে, উচ্চ এলাকায় ও মরিকেল জাতীয় গাছে বেশী দেখা যায়। এ জাতের ইন্দুর গুনাম জাত শস্য, ফল-মুগ, তরি-তরকারী ইত্যাদির বিশেষ ক্ষতি সাধন করে।



হিমালয়ান ইন্দুর : (*Rattus nitidus*)

এই ইন্দুরের পৃষ্ঠ দেশের পশম বাদামী এবং জীব বাজের কিঞ্চ পেটের পশমের রঙ গোড়ার দিকে ধূসর বর্ণের। লেজ মাথা ও দেহের সমান হয় এবং লেজের উপরের অংশ কালো। এবং নীচের অংশ ফ্যাকাশে বর্ণের। পিছনের পা লম্বা, সরু এবং ধৰণের সাদা পোমে আবৃত থাকে। ইহারা সাধারণত উচ্চ ভূমি ও বনাঞ্চলে গর্ত করে বসবাস করে। ইহারা সাধারণত উচ্চ ভূমির কৃষি ফসল যেমন- ধান, গম, ভূটা, গোলালু এবং ফল বাগানের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে।



ঘরের বাতি ইন্দুর : (*Mus musculus*)

ছেট আকারের এই ইন্দুরকে কেন কেন এলাকায় ঘরের বাতি ইন্দুর, কোথাও শহিদু ইন্দুর বলে থাকে। কিন্তু কুমিল্যা এই ইন্দুরকে বাতি ইন্দুর বলে। এই ইন্দুরের শরীর ও মাঝের দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজের দৈর্ঘ্য কিছুটা বড় হয়। পিছনের পাহাড়ের দৈর্ঘ্য সাধারণত: ১৪-১৮ সেমি; এর মত এবং এদের জেন পূর্ণ বকল অবস্থায় সাধারণত: ১৪-২৫ শায়ি হয়। পায়ের পশম ছাই বা হালকা তাপটে বর্ণের, পেটের পশম খালিকটা হালকা ধূসর বর্ণের। এরা ঘরে বাস করে, দুরে সংরক্ষিত খাদ্যাশয়, ঘরের জিনিসপুর, কাপড় চোপড় এবং বই পৃষ্ঠক এর ক্ষতি সাধন করে। এরা সারা বছরই বাচ্চা জন্ম দিতে পারে তবে, সাধারণত: বজ্রে ৭-৮ বার এবং প্রতিবারে ৪-৬টি বাচ্চা প্রসব করে। শ্রী ইন্দুর প্রসবের ৪৮ ঘণ্টা বা দুই দিনের মধ্যে পুনরায় গর্ভধারণ করতে পারে। এদের বাচ্চাদের বয়স দুই মাস পূর্ণ হলেই এরা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।



মাঠের ছেট নেংটি ইন্দুর : (*Mus booduga*)

ছেট আকারের এই ইন্দুর মাঠের নেংটি ইন্দুরের মতই। এই ইন্দুরের শরীর ও মাথার দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজের দৈর্ঘ্য কিছুটা বড় হয়। এরা সাধারণত মাঠে বাস করে। গায়ের উপরের দিকের পশম ধূসর ও পেটের দিক হালকা ধূসর বা সাদাটে ধূসর হয়। পশম ছেট এবং খুবই মসৃণ। মাঠের ছেট দানাদার ফসলের ক্ষতি করে থাকে। এরা মাটিতে গর্ত করে বাস করে। এদের গর্ত খুব ছেট এবং চিরন্ত অনেক সময় পেকার গর্ত বলে মনে হয়। এরা সারা বছরই বাচ্চা দেয়। এদের গর্ভধারণকাল ১৮-২১ দিন এবং শ্রী ইন্দুরের ক্ষমতা ৫ জোড়া বাচ্চা প্রসবের ৪৮ ঘণ্টার বা দুই দিনের মধ্যে শ্রী ইন্দুর আবার গর্ভধারণ করত অর্জন করে। বাচ্চাদের বয়স দুই মাস পূর্ণ হলেই এরা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।



সাদা-দাঁত বিশিষ্ট ইন্দুর : (*Berylmys bowersi*)

বেরিলমাইস থেজতি ফ্যাকাশে-জ্বাম অথবা সাদা এলামেছুক্ত হেনন সৈতের জন্ম শীর্ষীত। তাদের খাটো কুয়াশাপূর্ণ-ধূসর অথবা বাদামী-ধূসর রঙের পৃষ্ঠদেশের পশম যা ধৰণের সাদা পেট হইতে তীক্ষ্ণভাবে সীমানা চিহ্নিত করে থাকে। লেজ সাধারণত মাথা ও দেহের চেয়ে লম্বা। নীচের তুলনায় উপরের অংশ সামান্য কালো হয় এবং অগ্রভাগ সোজা অথবা সমস্ত সাদা অংশের শেষ পর্যন্ত হয়। ইহারা সাধারণত উচ্চ ভূমি ও বনাঞ্চলে গর্ত করে বসবাস করে। যেহেতু ইহারা বাসে অবস্থান করে গর্তে বাস করে তাই ইহারা উচ্চ হলের মাঠ ফসলসহ আশে পাশের ফসলসহের ক্ষতি করে থাকে।



আরও তথ্য জানার জন্য যোগাযোগ করুন

এইড-কুমিল্যা

গ্রাম ৪ গঞ্জপুর, ডাকঘরঃ রাজাপাড়া, ইউনিয়ন ৪ জগন্নাথপুর, উপজেলা ৪ কুমিল্যা সদর, জেলা ৪ কুমিল্যা।
টেলিফোন ৪ ০৮১-৬২৪৪৪, ০৮১-৭২০০৩ ফ্যাক্স ৪ ০৮১-৬২৪৪৪, ই-মেইল ৪ aidazad@btcl.net.bd
web page : www.aidcomilla.org



United Nations Development Programme
Chittagong Hill Tracts Development Facility (CHTDF)

Implemented by : AID-COMILLA



Reference : ACIAR, Australia, Dr. Ken P. Aplin, Dr. Peter R. Brown, Dr. Jens Jacob, Dr. Charles J. Krebs & Dr. Grant R. Singleton

Krishi Katha Published by : Department of Agriculture Extension, Bangladesh

Rodent Research Team in Bangladesh : Dr. Steven R Belmain, NRI, University of Greenwich, UK, Dr. Nazira Q Kamal, Dr. Santosh Kumar Sarker, Mohammad Harun, Md. Nazmul Islam Kadry, Abul Kalam Azad, Rokeya Begum Shafali of AID-COMILLA